arXiv:1612.03012v1 [math.CA] 9 Dec 2016

УДК 517.5

**А.С. Сердюк** (Інститут математики НАН України, Київ)
**Т.А. Степанюк** (Східноєвропейський нац. університет імені Лесі Українки, Луцьк)
**A.S. Serdyuk** (Institute of Mathematics NAS of Ukraine, Kyiv)
**T.A. Stepaniuk** (Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk)

**Наближення класів узагальнених інтегралів Пуассона сумами Фур'є в метриках просторів $L_s$**

**Approximations of classes of generalized Poisson integrals by Fourier sums in metrics of spaces $L_s$**

В метриках пространств $L_s$, $1 \le s \le \infty$, найдены асимптотические равенства для верхних граней приближений суммами Фурье на классах обобщенных интегралов Пуассона периодических функций, принадлежащих единичному шару пространства $L_1$.

In metrics of spaces $L_s$, $1 \le s \le \infty$, we find asymptotic equalities for upper bounds of approximations by Fourier sums on classes of generalized Poisson integrals of periodic functions, which belong to unit ball of space $L_1$.

Дана робота тісно пов'язана з роботами авторів [1, 2]. В ній продовжуються дослідження апроксимативних властивостей сум Фур'є на класах узагальнених інтегралів Пуассона $C^{\alpha,r}_{\beta,p}$.

Нехай $L_s$, $1 \le s < \infty$, — простір $2\pi$–періодичних сумовних в $s$–ій степені на $[0, 2\pi)$ функцій $f$, в якому норма задана формулою $\|f\|_s = \Big( \int\limits_0^{2\pi} |f(t)|^s dt \Big)^{\frac{1}{s}}$; $L_\infty$ — простір $2\pi$–періодичних вимірних і суттєво обмежених функцій $f$ з нормою $\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}\limits_t |f(t)|$; $C$ — простір $2\pi$–періодичних неперервних функцій $f$, у якому норма задається за допомогою рівності $\|f\|_C = \max\limits_t |f(t)|$.

Позначимо через $C^{\alpha,r}_{\beta,p}$, $\alpha > 0$, $r > 0$, $1 \le p \le \infty$, множину всіх $2\pi$–періодичних функцій, котрі при всіх $x \in \mathbb{R}$ зображуються за допомогою згортки (див., наприклад, [3, с. 144])

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} P_{\alpha,r,\beta}(x-t)\varphi(t)dt, \ a_0 \in \mathbb{R}, \ \varphi \in B^0_p, \tag{1}$$

$$B^0_p = \{\varphi : \ ||\varphi||_p \le 1, \ \varphi \perp 1\}, \ 1 \le p \le \infty,$$

з узагальненими ядрами Пуассона вигляду

$$P_{\alpha,r,\beta}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\alpha k^r} \cos\big(kt - \frac{\beta\pi}{2}\big), \quad \alpha > 0, \quad r > 0, \quad \beta \in \mathbb{R}. \tag{2}$$

Функції $f$ вигляду (1) називають узагальненими інтегралами Пуассона функцій $\varphi$. При $r = 1$ класи $C^{\alpha,r}_{\beta,p}$ є відомими класами інтегралів Пуассона.

При довільних $r > 0$ класи $C^{\alpha,r}_{\beta,p}$ належать до множини $D^\infty$ нескінченно диференційовних $2\pi$–періодичних функцій, тобто $C^{\alpha,r}_{\beta,p} \subset D^\infty$ (див., наприклад, [3, с. 139; 4, с. 1408]). Більш того, як випливає з теореми 1 роботи [5], при довільних $r > 0$, $\alpha > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$ і $1 \le p \le \infty$ має місце вкладення $C^{\alpha,r}_{\beta,p} \subset \mathcal{J}_{1/r}$, де $\mathcal{J}_a, a > 0$, — відомі класи Жевре

$$\mathcal{J}_a = \left\{ f \in D^\infty : \ \sup_{k \in \mathbb{N}} \Big( \frac{\|f^{(k)}\|_C}{(k!)^a} \Big)^{1/k} < \infty \right\}.$$

При $r \ge 1$ класи $C^{\alpha,r}_{\beta,p}$ складаються з функцій $f$, які допускають регулярне продовження в смугу $|\mathrm{Im}\ z| \le c$, $c > 0$ комплексної площини (див., наприклад, [3, с. 141]), тобто є класами аналітичних функцій. При $r > 1$ класи $C^{\alpha,r}_{\beta,p}$ складаються з функцій регулярних в усій комплексній площині, тобто є класами цілих функцій (див., наприклад, [3, с. 142]).

Розглянемо апроксимативні характеристики вигляду

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,p})_s = \sup_{f \in C^{\alpha,r}_{\beta,p}} \|f(\cdot) - S_{n-1}(f;\cdot)\|_s, \ r > 0, \ \alpha > 0, \ \beta \in \mathbb{R}, \ 1 \le p, s \le \infty, \tag{3}$$

де $S_{n-1}(f;\cdot)$ — частинні суми Фур'є порядку $n-1$ функції $f$.

На даний час порядкові оцінки величин $\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,p})_s$ вигляду (3) відомі при всіх допустимих значеннях параметрів $\alpha$, $r$, $\beta$, $p$ і $s$ (див. роботи [6, с. 60; 7–9] і наявну в них бібліографію).

У даній роботі досліджуватимуться величини (3) при $p = 1$ і $r \in (0, 1)$ з метою одержання для них асимптотичних при $n \to \infty$ рівностей.

При $s = \infty$ асимптотичні рівності для величин вигляду (3) відомі при всіх $r > 0$, $\alpha > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$ і $1 \le p \le \infty$ (див. роботи [1, 2]). В зазначеному випадку норму $\|\cdot\|_\infty$ у (3) можна замінити на $\|\cdot\|_C$, тобто $\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,p})_\infty = \mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,p})_C$.

Що ж стосується питання про сильну асимптотику при $n \to \infty$ величини (3) у випадку $p = 1$ зазначимо наступне.

Випадок $r = 1$, $s = 1$ дослідив С.М. Нікольський [10, с. 221], встановивши асимптотичну рівність

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,1}_{\beta,1})_1 = e^{-\alpha n}\Big(\frac{8}{\pi^2}\mathbf{K}(e^{-\alpha}) + O(1)n^{-1}\Big), \tag{4}$$

де

$$\mathbf{K}(q) := \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1 - q^2\sin^2 t}},\ q \in (0, 1),$$

— повний еліптичний інтеграл першого роду, а $O(1)$ — величина рівномірно обмежена відносно параметрів $n$ і $\beta$.

Згодом рівність (4) уточнив С.Б. Стєчкін в [11, с. 139], встановивши асимптотичну формулу

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,1}_{\beta,1})_1 = e^{-\alpha n}\Big(\frac{8}{\pi^2}\mathbf{K}(e^{-\alpha}) + O(1)\frac{e^{-\alpha}}{(1 - e^{-\alpha})n}\Big), \quad \alpha > 0,\ \beta \in \mathbb{R}, \tag{5}$$

в якій величина $O(1)$ рівномірно обмежена відносно всіх розглядуваних параметрів.

В роботі [12] при $r = 1$ і довільних $1 \le s \le \infty$ для величин $\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s$, $\alpha > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$, встановлено рівність

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,1}_{\beta,1})_s = e^{-\alpha n}\left(\frac{2}{\pi^{1+\frac{1}{s}}}\|\cos t\|_s K(s, e^{-\alpha}) + O(1)\frac{e^{-\alpha}}{n(1 - e^{-\alpha})^{\sigma(s)}}\right), \tag{6}$$

де

$$\sigma(s) := \begin{cases} 1, & s = 1, \\ 2, & s \in (1, \infty], \end{cases} \tag{7}$$

$$K(s, q) := \frac{1}{2^{1+\frac{1}{s}}}\Big\|(1 - 2q\cos t + q^2)^{-\frac{1}{2}}\Big\|_s,\ q \in (0, 1), \tag{8}$$

а величина $O(1)$ рівномірно обмежена відносно $n$, $s$, $\alpha$ і $\beta$. При $s = 1$, з урахуванням рівності $K(1, q) = \mathbf{K}(q)$, оцінка (6) збігається з оцінкою (5).

Як показано в [13], при $1 \le s < \infty$ має місце наступна рівність:

$$K(s, q) = \frac{\pi^{\frac{1}{s}}}{2}F^{\frac{1}{s}}\Big(\frac{s}{2}, \frac{s}{2}; 1; q^2\Big),\ q \in (0, 1), \tag{9}$$

де $F(a, b; c; z)$ гіпергеометрична функція Гаусса

$$F(a, b; c; z) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(a)_k(b)_k}{(c)_k}\frac{z^k}{k!}, \tag{10}$$

$$(x)_k := x(x+1)(x+2)...(x+k-1). \tag{11}$$

В [14, с. 250] було доведено, що для величин $\mathcal{E}_n(C^{\alpha,1}_{\beta,1})_s$ при $s=2$ виконується рівність

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,1}_{\beta,1})_2 = \frac{1}{\sqrt{\pi(1-e^{-2\alpha})}}e^{-\alpha n},\ \alpha>0,\ \beta\in\mathbb{R},\ n\in\mathbb{N}. \tag{12}$$

Рівність (12) уточнює асимптотичну рівність (6) при $s=2$ в наступному сенсі: зазначена рівність (6) при $s=2$ залишається вірною, якщо в ній обнулити залишковий член. Отже, взявши до уваги формули (7), (8) і (12) та очевидну рівність $F(1,1;1;q^2)=\frac{1}{1-q^2},\ \ q\in(0,1)$, для усіх $\alpha>0$, $\beta\in\mathbb{R}$, і $1\le s\le\infty$ можемо записати формулу

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,1}_{\beta,1})_s = \begin{cases} e^{-\alpha n}\left(\frac{\|\cos t\|_s}{\pi}F^{\frac{1}{s}}\left(\frac{s}{2},\frac{s}{2};1;e^{-\alpha}\right)+O(1)\frac{\xi(s)e^{-\alpha}}{n(1-e^{-\alpha})^{\sigma(s)}}\right), & 1\le s<\infty,\\ e^{-\alpha n}\left(\frac{1}{\pi(1-e^{-\alpha})}+O(1)\frac{e^{-\alpha}}{n(1-e^{-\alpha})^2}\right), & s=\infty, \end{cases} \tag{13}$$

в якій

$$\xi(s)=\begin{cases} 0, & s=2,\\ 1, & s\in[1,2)\cup(2,\infty), \end{cases}$$

$\sigma(s)$ означена формулою (7), а $O(1)$ — величина, що рівномірно обмежена відносно усіх розглядуваних параметрів.

Крім того, як випливає з [14], при всіх $r>0$ має місце рівність

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\Big(\sum_{k=n}^{\infty}e^{-2\alpha k^r}\Big)^{\frac{1}{2}},\ \alpha>0,\ r>0,\ \beta\in\mathbb{R},\ n\in\mathbb{N}. \tag{14}$$

У випадку $r>1$ і $s=1$ асимптотично точні оцінки для величин $\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s$, $\alpha>0$, $\beta\in\mathbb{R}$, були одержані О.І. Степанцем [15, с.155], який показав, що для довільних $n\in\mathbb{N}$

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_1 = \Big(\frac{4}{\pi}+\gamma_n\Big)e^{-\alpha n^r}, \tag{15}$$

де

$$|\gamma_n|<2\Big(1+\frac{1}{\alpha r n^{r-1}}\Big)e^{-\alpha r n^{r-1}}.$$

Згодом С.О. Теляковський [16, с. 517] при $r>1$, $\alpha>0$ і $\beta\in\mathbb{R}$ встановив асимптотичну рівність

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_1 = \frac{4}{\pi}e^{-\alpha n^r}+O(1)\Big(e^{-\alpha(2(n+1)^r-n^r)}+\Big(1+\frac{1}{\alpha r(n+2)^r}\Big)e^{-\alpha(n+2)^r}\Big), \tag{16}$$

де $O(1)$ — величина, що рівномірно обмежена відносно всіх розглядуваних параметрів. Формула (16) містить більш точну оцінку залишкового члена в асимптотичному розкладі величин $\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_1$ у порівнянні з оцінкою (15).

При $r>1$ і довільних $1\le s\le\infty$ асимптотичні рівності для величин $\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s$, $\alpha>0$, $\beta\in\mathbb{R}$, знайдені в [12, с. 1408] і мають вигляд

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s = e^{-\alpha n^r}\Big(\frac{\|\cos t\|_s}{\pi}+O(1)\Big(1+\frac{1}{\alpha r n^{r-1}}\Big)e^{-\alpha r n^{r-1}}\Big), \tag{17}$$

де величина $O(1)$ рівномірно обмежена відносно всіх розглядуваних параметрів. При $s = 1$ формула (17) випливає із (15) і (16).

Що ж стосується випадку $0 < r < 1$, то асимптотичні рівності для величин $\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s$, $\alpha > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$, за виключенням наведеного випадку $s = 2$, були відомі у випадку $s = 1$ (див. [15, с.153])

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_1 = \frac{4}{\pi^2} e^{-\alpha n^r} \ln n^{1-r} + O(1) e^{-\alpha n^r}, \tag{18}$$

а також у випадку $s = \infty$ (див. [1, 2])

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_\infty = e^{-\alpha n^r} n^{1-r} \left( \frac{1}{\pi \alpha r} + O(1) \Big( \frac{1}{(\alpha r)^2} \frac{1}{n^r} + \frac{1}{n^{1-r}} \Big) \right), \tag{19}$$

де $O(1)$ — величини, що рівномірно обмежені відносно параметрів $n$ і $\beta$.

Зауважимо, що на класах $C^{\alpha,r}_{\beta,1}$, $\alpha > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$, при $0 < r < 1$ у випадку наближень в метриках просторів $L_s, 1 < s \le \infty$, суми Фур'є забезпечують порядок найкращих наближень тригонометричними поліномами, тобто (див., наприклад, [7, 8])

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s \asymp E_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s \asymp e^{-\alpha n^r} n^{\frac{1-r}{s'}}, \quad \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = 1,$$

де

$$E_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s = \sup_{f \in C^{\alpha,r}_{\beta,1}} \inf_{t_{n-1} \in \mathcal{T}_{2n-1}} \|f - t_{n-1}\|_s,$$

$\mathcal{T}_{2n-1}$ — підпростір усіх тригонометричних поліномів $t_{n-1}$ порядку не вищого за $n - 1$.

В даній роботі встановлено асимптотично непокращувані оцінки величин $\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s$, $\alpha > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$, при довільних $0 < r < 1$ і $1 \le s \le \infty$. При цьому в отриманих асимптотичних рівностях в явному вигляді виписані оцінки залишкового члена через параметри задачі, що може бути корисним для практичного застосування.

При довільних фіксованих $\alpha > 0$, $r \in (0, 1)$ і $1 \le p \le \infty$ через $n_0 = n_0(\alpha, r, p)$ позначимо найменший з номерів $n$ такий, що

$$\frac{1}{\alpha r} \frac{1}{n^r} + \frac{\alpha r \chi(p)}{n^{1-r}} \le \begin{cases} \frac{1}{14}, & p = 1, \\ \frac{1}{(3\pi)^3} \cdot \frac{p-1}{p}, & 1 < p < \infty, \\ \frac{1}{(3\pi)^3}, & p = \infty, \end{cases} \tag{20}$$

де $\chi(p) = p$ при $1 \le p < \infty$ і $\chi(p) = 1$ при $p = \infty$; через $n_1 = n_1(\alpha, r)$ — найменший з номерів $n$ такий, що

$$\frac{1}{\alpha r} \frac{1}{n^r} \Big( 1 + \ln \Big( \frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r} \Big) \Big) + \frac{\alpha r}{n^{1-r}} \le \frac{1}{(3\pi)^3}. \tag{21}$$

Також при довільних $\upsilon > 0$ і $1 \le s \le \infty$ покладемо

$$\mathcal{J}_s(\upsilon) := \Big\| \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}} \Big\|_{L_s[0,\upsilon]}, \tag{22}$$

де

$$\|f\|_{L_s[a,b]} = \begin{cases} \left(\int\limits_a^b |f(t)|^s dt\right)^{\frac{1}{s}}, & 1 \le s < \infty, \\ \operatorname*{ess\,sup}\limits_{t\in[a,b]} |f(t)|, & s = \infty. \end{cases}$$

В прийнятих позначеннях має місце наступне твердження.

**Теорема 1.** *Нехай $0 < r < 1$, $1 \le s \le \infty$, $\alpha > 0$ і $\beta \in \mathbb{R}$. Тоді при $n \ge n_0(\alpha, r, s')$, $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = 1$, справедлива оцінка*

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s = e^{-\alpha n^r} n^{\frac{1-r}{s'}} \left( \frac{\|\cos t\|_s}{\pi^{1+\frac{1}{s}} (\alpha r)^{\frac{1}{s'}}} \mathcal{J}_s\Big(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\Big) + \gamma^{(1)}_{n,s} \Big( \frac{1}{(\alpha r)^{1+\frac{1}{s'}}} \mathcal{J}_s\Big(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\Big) \frac{1}{n^r} + \frac{1}{n^{\frac{1-r}{s'}}} \Big) \right), \quad (23)$$

*де для величини $\gamma^{(1)}_{n,s} = \gamma^{(1)}_{n,s}(\alpha, r, \beta)$ виконується нерівність $|\gamma^{(1)}_{n,s}| \le (14\pi)^2$.*

**Доведення теореми 1.** Згідно з (1) і (3)

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s = \frac{1}{\pi} \sup_{\varphi \in B^0_1} \left\| \int\limits_{-\pi}^{\pi} P^{(n)}_{\alpha,r,\beta}(x-t)\varphi(t)dt \right\|_s, \quad 1 \le s \le \infty, \quad (24)$$

де

$$P^{(n)}_{\alpha,r,\beta}(t) := \sum_{k=n}^{\infty} e^{-\alpha k^r} \cos\Big(kt - \frac{\beta\pi}{2}\Big), \ 0 < r < 1, \ \alpha > 0, \ \beta \in \mathbb{R}. \quad (25)$$

Далі скористаємось наступним твердженням з роботи [12, с. 1398].

**Лема** 1. *Нехай $K \in L_s$, $1 \le s \le \infty$. Тоді для величини*

$$\mathcal{E}(K)_s := \sup_{\varphi \in B^0_1} \left\| \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} \varphi(\cdot - t) K(t) dt \right\|_s$$

*виконуються співвідношення*

$$\frac{1}{2\pi} \sup_{h\in\mathbb{R}} \|K(\cdot) - K(\cdot + h)\|_s \le \mathcal{E}(K)_s \le \frac{1}{\pi} \|K\|_s. \quad (26)$$

Покладаючи в умовах леми 1 $K(t) = P^{(n)}_{\alpha,r,\beta}(t)$ і враховуючи рівність (24), з (26) отримуємо співвідношення

$$\frac{1}{2\pi} \sup_{h\in\mathbb{R}} \|P^{(n)}_{\alpha,r,\beta}(\cdot) - P^{(n)}_{\alpha,r,\beta}(\cdot + h)\|_s \le \mathcal{E}(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s \le \frac{1}{\pi} \|P^{(n)}_{\alpha,r,\beta}\|_s, \quad 1 \le s \le \infty. \quad (27)$$

Згідно з [1] та [2] при довільних $r \in (0,1)$, $\alpha > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$, $1 \le s \le \infty$, $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = 1$ і $n \in \mathbb{N}$ при $n \ge n_0(\alpha, r, s')$ мають місце співвідношення

$$\frac{1}{\pi} \|P^{(n)}_{\alpha,r,\beta}\|_s =$$

$$= e^{-\alpha n^r} n^{\frac{1-r}{s'}} \left( \frac{\|\cos t\|_s}{\pi^{1+\frac{1}{s}} (\alpha r)^{\frac{1}{s'}}} \mathcal{J}_s\Big(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\Big) + \delta^{(1)}_{n,s} \Big( \frac{1}{(\alpha r)^{1+\frac{1}{s'}}} \mathcal{J}_s\Big(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\Big) \frac{1}{n^r} + \frac{1}{n^{\frac{1-r}{s'}}} \Big) \right), \quad (28)$$

$$\frac{1}{\pi}\inf_{\lambda\in\mathbb{R}}\|P^{(n)}_{\alpha,r,\beta}(\cdot)-\lambda)\|_s=$$

$$=e^{-\alpha n^r}n^{\frac{1-r}{s'}}\left(\frac{\|\cos t\|_s}{\pi^{1+\frac{1}{s}}(\alpha r)^{\frac{1}{s'}}}\mathcal{J}_s\Big(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\Big)+\delta^{(2)}_{n,s}\Big(\frac{1}{(\alpha r)^{1+\frac{1}{s'}}}\mathcal{J}_s\Big(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\Big)\frac{1}{n^r}+\frac{1}{n^{\frac{1-r}{s'}}}\Big)\right), \tag{29}$$

$$\frac{1}{2\pi}\sup_{h\in\mathbb{R}}\|P^{(n)}_{\alpha,r,\beta}(\cdot)-P^{(n)}_{\alpha,r,\beta}(\cdot+h)\|_s=$$

$$=e^{-\alpha n^r}n^{\frac{1-r}{s'}}\left(\frac{\|\cos t\|_s}{\pi^{1+\frac{1}{s}}(\alpha r)^{\frac{1}{s'}}}\mathcal{J}_s\Big(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\Big)+\delta^{(3)}_{n,s}\Big(\frac{1}{(\alpha r)^{1+\frac{1}{s'}}}\mathcal{J}_s\Big(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\Big)\frac{1}{n^r}+\frac{1}{n^{\frac{1-r}{s'}}}\Big)\right), \tag{30}$$

де для величин $\delta^{(i)}_{n,s}=\delta^{(i)}_{n,s}(\alpha,r,\beta)$, $i=\overline{1,3}$ виконується нерівність $|\delta^{(i)}_{n,s}|\le(14\pi)^2$.

З формул (27), (28) і (30) випливає (23). Теорему 1 доведено.

Наведемо деякі наслідки з теореми 1.

При $1<s<\infty$ з теореми 1 випливає наступне твердження.

**Теорема 2.** *Нехай $0<r<1$, $1<s<\infty$, $\alpha>0$ і $\beta\in\mathbb{R}$. Тоді при $n\ge n_0(\alpha,r,s')$, $\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=1$, справедлива оцінка*

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s=e^{-\alpha n^r}n^{\frac{1-r}{s'}}\left(\frac{\|\cos t\|_s}{\pi^{1+\frac{1}{s}}(\alpha r)^{\frac{1}{s'}}}F^{\frac{1}{s}}\Big(\frac{1}{2},\frac{3-s}{2};\frac{3}{2};1\Big)+\right.$$

$$\left.+\gamma^{(2)}_{n,s}\Big(\Big(1+\frac{(\alpha r)^{\frac{s-1}{s'}}}{s-1}\Big)\frac{1}{n^{\frac{1-r}{s'}}}+\frac{(s')^{\frac{1}{s}}}{(\alpha r)^{1+\frac{1}{s'}}}\frac{1}{n^r}\Big)\right), \tag{31}$$

*де $F(a,b;c;z)$ — гіпергеометрична функція Гаусса, а для величини $\gamma^{(2)}_{n,s}=\gamma^{(2)}_{n,s}(\alpha,r,\beta)$ виконується нерівність $|\gamma^{(2)}_{n,s}|\le(14\pi)^2$.*

**Доведення теореми 2.** Згідно з теоремою 1 для всіх $1<s<\infty$, $0<r<1$, $\alpha>0$, $\beta\in\mathbb{R}$ при $n\ge n_0(\alpha,r,s')$, $\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=1$, має місце наступна оцінка:

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s=e^{-\alpha n^r}n^{\frac{1-r}{s'}}\left(\frac{\|\cos t\|_s}{(\alpha r)^{\frac{1}{s'}}\pi^{1+\frac{1}{s}}}\Big(\int\limits_0^{\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}}\frac{dt}{(t^2+1)^{\frac{s}{2}}}\Big)^{\frac{1}{s}}+\right.$$

$$\left.+\gamma^{(1)}_{n,s}\Big(\frac{1}{(\alpha r)^{1+\frac{1}{s'}}}\Big(\int\limits_0^{\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}}\frac{dt}{(t^2+1)^{\frac{s}{2}}}\Big)^{\frac{1}{s}}\frac{1}{n^r}+\frac{1}{n^{\frac{1-r}{s'}}}\Big)\right), \tag{32}$$

де $\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=1$, і величина $\gamma^{(1)}_{n,s}=\gamma^{(1)}_{n,s}(\alpha,r,\beta)$ така, що $|\gamma^{(1)}_{n,s}|\le(14\pi)^2$.

В [2] доведено, що при $n\ge n_0(\alpha,r,s')$, виконується оцінка

$$\Big(\int\limits_0^{\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}}\frac{dt}{(t^2+1)^{\frac{s}{2}}}\Big)^{\frac{1}{s}}=\Big(\int\limits_0^{\infty}\frac{dt}{(t^2+1)^{\frac{s}{2}}}\Big)^{\frac{1}{s}}+\frac{\Theta^{(1)}_{\alpha,r,s',n}}{s-1}\Big(\frac{\alpha r}{\pi n^{1-r}}\Big)^{s-1}, \tag{33}$$

де $|\Theta^{(1)}_{\alpha,r,s',n}|<2$.

Легко бачити, що (див., наприклад, [17, с.962])

$$\int\limits_0^\infty \frac{dt}{(t^2+1)^{\frac{s}{2}}} = \frac{1}{2}\int\limits_0^\infty \frac{t^{-\frac{1}{2}}dt}{(t+1)^{\frac{s}{2}}} = \frac{1}{2}B\Big(\frac{1}{2}, \frac{s-1}{2}\Big), \quad 1 < s < \infty, \tag{34}$$

де

$$B(x,y) := \int\limits_0^\infty \frac{u^{x-1}du}{(u+1)^{x+y}}, \quad x, y > 0,$$

— ейлеровий інтеграл 1-го роду.

Врахувавши формулу [17, с. 964]

$$B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} = B(y,x),$$

де

$$\Gamma(z) = \int\limits_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt, \quad Rez > 0,$$

— ейлеровий інтеграл 2-го роду, та скориставшись теоремою Гаусса [17, с. 1056]

$$F(a,b;c;1) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}$$

при $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{3-s}{2}$, $c = \frac{3}{2}$, з (34) отримуємо

$$\int\limits_0^\infty \frac{dt}{(t^2+1)^{\frac{s}{2}}} = \frac{1}{2}\frac{\Gamma\big(\frac{1}{2}\big)\Gamma\big(\frac{s-1}{2}\big)}{\Gamma\big(\frac{s}{2}\big)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\frac{\Gamma\big(\frac{s-1}{2}\big)}{\Gamma\big(\frac{s}{2}\big)} = \frac{\Gamma\big(\frac{3}{2}\big)\Gamma\big(\frac{s-1}{2}\big)}{\Gamma\big(\frac{s}{2}\big)} = F\Big(\frac{1}{2}, \frac{3-s}{2}; \frac{3}{2}; 1\Big).$$

Отже, для довільних $1 < s < \infty$ має місце рівність

$$\Big(\int\limits_0^\infty \frac{dt}{(t^2+1)^{\frac{s}{2}}}\Big)^{\frac{1}{s}} = F^{\frac{1}{s}}\Big(\frac{1}{2}, \frac{3-s}{2}; \frac{3}{2}; 1\Big). \tag{35}$$

Врахувавши оцінку

$$\Big(\int\limits_0^{\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}} \frac{dt}{(t^2+1)^{\frac{s}{2}}}\Big)^{\frac{1}{s}} \le \Big(\int\limits_0^\infty \frac{dt}{(t^2+1)^{\frac{s}{2}}}\Big)^{\frac{1}{s}} < \Big(1 + \int\limits_1^\infty \frac{dt}{t^s}\Big)^{\frac{1}{s}} < (s')^{\frac{1}{s}}, \tag{36}$$

з формул (32), (33), (35) і (36) отримуємо

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_s = e^{-\alpha n^r} n^{\frac{1-r}{s'}}\Bigg(\frac{\|\cos t\|_s}{\pi^{1+\frac{1}{s}}(\alpha r)^{\frac{1}{s'}}}F^{\frac{1}{s}}\Big(\frac{1}{2}, \frac{3-s}{2}; \frac{3}{2}; 1\Big) +$$

$$+ \gamma^{(3)}_{n,s}\Big(\frac{1}{s-1}\frac{(\alpha r)^{\frac{s-1}{s'}}}{n^{(1-r)(s-1)}} + \frac{(s')^{\frac{1}{s}}}{(\alpha r)^{1+\frac{1}{s'}}}\frac{1}{n^r} + \frac{1}{n^{\frac{1-r}{s'}}}\Big)\Bigg), \tag{37}$$

де для величини $\gamma^{(3)}_{n,s} = \gamma^{(3)}_{n,s}(\alpha, r, \beta)$ виконується нерівність $|\gamma^{(3)}_{n,s}| \le (14\pi)^2$.

Оскільки

$$\frac{1}{n^{\frac{1-r}{s'}}}=\frac{1}{n^{(1-r)\frac{s-1}{s}}}>\frac{1}{n^{(1-r)(s-1)}},$$

то

$$\frac{1}{s-1}\frac{(\alpha r)^{\frac{s-1}{s'}}}{n^{(1-r)(s-1)}}+\frac{1}{n^{\frac{1-r}{s'}}}\le\Big(1+\frac{(\alpha r)^{\frac{s-1}{s'}}}{s-1}\Big)\frac{1}{n^{\frac{1-r}{s'}}}. \tag{38}$$

З (37) і (38) випливає (44). Теорему 2 доведено.

З теореми 2 при $s=2$ одержуємо наступне твердження.

**Наслідок 1.** *Нехай $0<r<1$, $\alpha>0$ і $\beta\in\mathbb{R}$. Тоді при $n\ge n_0(\alpha,r,2)$ справедлива оцінка*

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_2=\frac{e^{-\alpha n^r}}{\sqrt{2\pi\alpha r}}n^{\frac{1-r}{2}}\left(1+\gamma_n^{(1)}\Big(\Big(\alpha r+\sqrt{\alpha r}\Big)\frac{1}{n^{\frac{1-r}{2}}}+\frac{\sqrt{2}}{\alpha r}\frac{1}{n^r}\Big)\right). \tag{39}$$

*де для величини $\gamma_n^{(1)}=\gamma_n^{(1)}(\alpha,r,\beta)$ виконується нерівність $|\gamma_n^{(1)}|\le 392\pi^{\frac{5}{2}}$.*

**Доведення наслідку 1.** Дійсно, поклавши в рівності (44) $s=s'=2$, врахувавши, що $F\Big(\frac{1}{2},\frac{1}{2};\frac{3}{2};1\Big)=\frac{\pi}{2}$, при $n\ge n_0(\alpha,r,2)$ отримуємо

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_2=e^{-\alpha n^r}n^{\frac{1-r}{2}}\left(\frac{\|\cos t\|_2}{\pi^{\frac{3}{2}}(\alpha r)^{\frac{1}{2}}}\left(F^{\frac{1}{2}}\Big(\frac{1}{2},\frac{1}{2};\frac{3}{2};1\Big)+\gamma_{n,2}^{(2)}\Big(\Big(1+\sqrt{\alpha r}\Big)\frac{1}{n^{\frac{1-r}{2}}}+\frac{\sqrt{2}}{(\alpha r)^{\frac{3}{2}}}\frac{1}{n^r}\Big)\right)=\right.$$

$$=\frac{e^{-\alpha n^r}}{\sqrt{2\pi\alpha r}}n^{\frac{1-r}{2}}\left(1+\gamma_{n,2}^{(2)}\sqrt{2\pi}\Big(\Big(1+\sqrt{\alpha r}\Big)\frac{\sqrt{\alpha r}}{n^{\frac{1-r}{2}}}+\frac{\sqrt{2}}{\alpha r}\frac{1}{n^r}\Big)\right).$$

Наслідок 1 доведено.

Утім більш точну, ніж (39), оцінку можна одержати виходячи з рівності (14). А саме, з урахуванням (14), а також формули (10) з роботи [1] при $\alpha>0$, $r\in(0,1)$, $\beta\in\mathbb{R}$ і $n\ge n_0(\alpha,r,2)$ має місце оцінка

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_2=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\Big(\sum_{k=n}^{\infty}e^{-2\alpha k^r}\Big)^{\frac{1}{2}}=\frac{e^{-\alpha n^r}}{\sqrt{2\pi\alpha r}}n^{\frac{1-r}{2}}\Big(1+\gamma_n^{(2)}\Big(\frac{1}{2\alpha r}\frac{1}{n^r}+\frac{\alpha r}{n^{1-r}}\Big)\Big), \tag{40}$$

в якій для величини $\gamma_n^{(2)}=\gamma_n^{(2)}(\alpha,r)$ виконується нерівність $|\gamma_n^{(2)}|\le\sqrt{\frac{54\pi^3}{54\pi^3-1}}$.

При $s=1$ теорема 1 дозволяє уточнити асимптотичну рівність (18). Має місце наступне твердження.

**Теорема 3.** *Нехай $0<r<1$, $\alpha>0$ і $\beta\in\mathbb{R}$. Тоді при $n\ge n_1(\alpha,r)$ справедлива оцінка*

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_1=\frac{4}{\pi^2}e^{-\alpha n^r}\ln\Big(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\Big)+\gamma_{n,1}^{(2)}e^{-\alpha n^r}, \tag{41}$$

*де для величини $\gamma_{n,1}^{(2)}=\gamma_{n,1}^{(2)}(\alpha,r,\beta)$ виконується нерівність $|\gamma_{n,1}^{(2)}|\le 20\pi^4$.*

**Доведення теореми 3.** Із (20) і (21) випливає, що $n_1(\alpha,r)>n_0(\alpha,r,1)$. Тому, поклавши в рівності (23) $s=1$ та врахувавши оцінку

$$\int\limits_0^{\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}}\frac{dt}{\sqrt{t^2+1}}=\int\limits_1^{\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}}\frac{dt}{t}+\left(\int\limits_0^{\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}}\frac{dt}{\sqrt{t^2+1}}-\int\limits_1^{\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}}\frac{dt}{t}\right)=\ln\Big(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\Big)+\Theta_{\alpha,r,n},\quad 0<\Theta_{\alpha,r,n}<1,$$

при $n \geq n_1(\alpha, r)$ отримаємо

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,1})_1 = e^{-\alpha n^r}\left(\frac{4}{\pi^2}\int\limits_0^{\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}}\frac{dt}{\sqrt{t^2+1}} + \gamma^{(1)}_{n,\infty}\left(\frac{1}{\alpha r}\frac{1}{n^r}\int\limits_0^{\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}}\frac{dt}{\sqrt{t^2+1}} + 1\right)\right) =$$

$$= e^{-\alpha n^r}\left(\frac{4}{\pi^2}\ln\left(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\right) + \frac{4}{\pi^2}\Theta_{\alpha,r,n} + \gamma^{(1)}_{n,\infty}\left(\frac{1}{\alpha r}\frac{1}{n^r}\ln\left(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\right) + \frac{\Theta_{\alpha,r,n}}{\alpha r n^r} + 1\right)\right). \tag{42}$$

Підрахунки показують, що при $n \geq n_1(\alpha, r)$

$$\frac{4}{\pi^2}\Theta_{\alpha,r,n} + |\gamma^{(1)}_{n,\infty}|\left(\frac{1}{\alpha r}\frac{1}{n^r}\ln\left(\frac{\pi n^{1-r}}{\alpha r}\right) + \frac{\Theta_{\alpha,r,n}}{\alpha r n^r} + 1\right) \leq 20\pi^4, \tag{43}$$

а, тому з (42) і (43) отримуємо (41). Теорему 3 доведено.

Зі співвідношення (41) випливає встановлена О.І. Степанцем асимптотична рівність (18).

На завершення роботи зауважимо, що з урахуванням формул (35) і (38) один з основних результатів роботи [1] — оцінка (8) з теореми 2 — може бути сформульоваим наступним чином.

**Теорема 4.** *Нехай $0 < r < 1$, $1 < p < \infty$, $\alpha > 0$ і $\beta \in \mathbb{R}$. Тоді при $n \geq n_0(\alpha, r, p)$ справедлива оцінка*

$$\mathcal{E}_n(C^{\alpha,r}_{\beta,p})_\infty = e^{-\alpha n^r} n^{\frac{1-r}{p}}\left(\frac{\|\cos t\|_{p'}}{\pi^{1+\frac{1}{p'}}(\alpha r)^{\frac{1}{p}}}F^{\frac{1}{p'}}\left(\frac{1}{2}, \frac{3-p'}{2}; \frac{3}{2}; 1\right) + \right.$$

$$\left. + \gamma^{(2)}_{n,p}\left(\left(1 + \frac{(\alpha r)^{\frac{p'-1}{p}}}{p'-1}\right)\frac{1}{n^{\frac{1-r}{p}}} + \frac{(p)^{\frac{1}{p'}}}{(\alpha r)^{1+\frac{1}{p}}}\frac{1}{n^r}\right)\right), \tag{44}$$

*в якій $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, $F(a, b; c; z)$ — гіпергеометрична функція Гаусса, а для величини $\gamma^{(2)}_{n,p} = \gamma^{(2)}_{n,p}(\alpha, r, \beta)$ виконується нерівність $|\gamma^{(2)}_{n,p}| \leq (14\pi)^2$.*


1. *Сердюк А.С., Степанюк Т.А.* Рівномірні наближення сумами Фур'є на класах згорток з узагальненими ядрами Пуассона // Доповіді НАНУ — 2016. — №11. — С. 10–16.

2. *Serdyuk A.S., Stepaniuk T.A.,* Uniform approximations by Fourier sums on classes of generalized Poisson integrals // Arxiv preprint, arXiv:1603.01891, (2016), 31 p.

3. *Степанец А.И.* Методы теории приближений: В 2 ч. // Праці Інституту математики НАН України — Киев: Ин-т математики НАН Украины, 2002. — **40**. — Ч.I. — 427 с.

4. *Степанець О.І., Сердюк А.С., Шидліч А.Л.* Про деякі нові критерії нескінченної диференційовності періодичних функцій // Укр. мат. журн. — 2007. — **59**, №10. — С. 1399–1409.

5. *Степанец А.И., Сердюк А.С., Шидлич А.Л.* О связи классов $(\psi, \beta)$–дифференцируемых функций с классами Жевре // Укр. мат. журн. — 2009. — **61**, № 1. — С. 140-145.

6. Степанец А.И. Методы теории приближений: В 2 ч. // Пр. Ін-ту математики НАН України Т. 40. — К.: Ин-т математики НАН Украины, 2002. — Ч. II. — 427 с.

7. *Сердюк А.С., Степанюк Т.А.* Порядкові оцінки найкращих наближень і наближень сумами Фур'є класів нескінченно диференційовних функцій// Теорія наближення функцій та суміжні питання: Зб. праць Ін–ту математики НАН України. — Київ: Інститут математики НАН України, 2013. — **10**, №1. — С. 255–282.

8. *Сердюк А.С., Степанюк Т.А.* Оцінки найкращих наближень класів нескінченно диференційовних функцій в рівномірній та інтегральній метриках // Укр. мат. журн. — 2014. — **66**, №9. — С.1244–1256.

9. *A.S. Serdyuk and T.A. Stepanyuk,* Estimates for approximations by Fourier sums, best approximations and best orthogonal trigonometric approximations of the classes of $(\psi, \beta)$–differentiable functions, Bulletin: de la societe des sciences et des letters de Lodz, vol. **66**, No 2 (2016).

10. *Никольский С.М.* Приближение функций тригонометрическими полиномами в среднем // Известия АН СССР. Сер. мат. — 1946. — **10**, №3. — С. 207–256.

11. *Стечкин С.Б.* Оценка остатка ряда Фурье для дифференцируемых функций // Труды Мат. Ин-та АН СССР. — 1980. — **145**. — С. 126–151.

12. *Сердюк А.С.* Наближення класів аналітичних функцій сумами Фур'є в метриці простору $L_p$ // Укр. мат. журн. — 2005. — **57**, №10. — С. 1395—1408.

13. *Сердюк А.С.* Наближення інтерполяційними тригонометричними поліномами на класах періодичних аналітичних функцій // Укр. мат. журн. — 2012. — **64**, № 5. — С. 698–712.

14. Сердюк А.С., Соколенко І.В. Наближення лінійними методами класів $(\psi, \overline{\beta})$–диференційовних функцій // Теорія наближення функцій та суміжні питання: Зб. праць Ін–ту математики НАН України. — 2013. — Т. 10, №1. — С. 245–254.

15. *Степанец А.И.* Классификация и приближение периодических функций. — Киев: Наук. думка — 1987. — 268 с.

16. *Теляковский С.А.* О приближении суммами Фурье функций высокой гладкости // Укр. матем. журн.— 1989. — **41**, №4. — С. 510–518.

17. Грандштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. — М.: Гос. из-во физ.-мат. лит-ры, 1963. — 1100 с.